

肝癌治療順序	第一線	第一線	第一線
學名	Atezolizumab + bevacizumab	Sorafenib	Lenvatinib
商品名	Tecentriq + Avastin 癌自禦 + 癌思停	Nexavar 蕾莎瓦	Lenvima 樂衛瑪
藥物種類	PD-1 免疫檢查點抑制劑+ 單株抗體	標靶藥物	標靶藥物
臨床效果: mOS (mo) 整體存活中位數	19.2	10.7	13.6
臨床效果: mPFS (mo) 疾病無惡化存活中位數	6.9	5.5	7.3
臨床效果: ORR (%) 腫瘤完全消失或縮小比率	30	2	19
臨床效果: DCR (%) 腫瘤完全消失、縮小或穩定的比率	74	43	73
任何治療相關副作用 (第三級以上) (%)	43	45	57
因副作用而治療中斷比率 (%)	7	11	9
用法劑量	Tecentriq 的建議劑量為 1200 mg，以靜脈輸注 60 分鐘以上，接著在同一天給予 15 mg/kg 的 Avastin (bevacizumab)，每 3 週一次。	每日建議劑量為一次 400 毫克(2 顆 200 毫克錠劑)，一天服用 2 次，不與食物一起服用(至少用餐前一小時或用餐後 2 小時)。	體重大於或等於 60 公斤(kg)的病人為 12 mg，或體重小於 60 公斤(kg)的病人為 8 mg。