

六、您對於醫療方式的考量

項目	完全不在意 \longrightarrow 非常在意					
	0	1	2	3	4	5
金額太高	0	1	2	3	4	5
每天都要吃藥	0	1	2	3	4	5
藥物吃太久	0	1	2	3	4	5
太多副作用	0	1	2	3	4	5
其他 _____	0	1	2	3	4	5

七、請回答下列問題

	對	不對	不確定
瘧疾預防藥出國後再吃就可以了	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
離開疫區後，就可以停藥了	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
服用瘧疾預防用藥後，就可以不用其他防蚊措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



八、我的瘧疾預防藥物選擇?

選項
1. Doxycycline (得喜寧膠囊)
2. Mefloquine(美爾奎寧)
3. Malarone(阿托奎酮與氯胍混合製劑)
4. 不進行使用，原因_____
5. 對於以上治療方式，我想要再瞭解更多，我的問題有： _____




九、參考資料

- 彰化基督教醫院旅遊醫學中心「疾病介紹-瘧疾」。更新日期：2019年。
- 衛生福利部疾病管制署「傳染病介紹-瘧疾」。更新日期：2021年2月9日。



我要去**瘧疾高風險地區**，該選擇哪種預防用藥？



一、前言

預防瘧疾感染，除了正確的防蚊措施外，也建議服用瘧疾預防用藥。這張表單可以幫助您了解現行瘧疾預防用藥有哪些種類可以選擇，請您跟著以下的步驟，選擇合適的用藥。

二、適用對象

前往以下國家之旅客：



非洲



中南美洲



東南亞/南亞



大洋洲島

★ 泰國、緬甸、柬埔寨及其臨界地區已有Mefloquine抗藥性報告

三、瘧疾簡介

◆瘧蚊叮咬傳播瘧原蟲引起。

◆潛伏期：約為7至30天。

◆常見症狀：發燒、畏寒顫抖、出汗、頭痛、噁心、全身酸痛及倦怠，瘧疾重症患者死亡率可超過10%。

◆若為慢性感染，可能導致生長遲滯、智能受阻、嚴重貧血或腎病症候群。

四、醫療選項

Doxycycline 得喜寧膠囊	Mefloquine 美爾奎寧	Malarone 阿托奎酮與 氯胍混合製劑
		
深綠色膠囊	白色錠劑	深磚紅色 膜衣錠

五、瘧疾藥物比較

	Doxy- cycline 得喜寧 膠囊	Meflo- quine 美爾奎 寧	Mala- rone 阿托奎 酮與 氯胍混 合製劑
藥物服用方式與效用			
價格	14元 /週	294元 /週	1708元 /週
服藥 頻率	每日 一次	每週 一次	每日 一次
保護力	89%- 99%	89%- 99%	93%



	Doxy- cycline 得喜寧 膠囊	Meflo- quine 美爾奎 寧	Mala- rone 阿托奎 酮與 氯胍混 合製劑
藥物持續服用期間			
開始	抵達前 1-2日	抵達前 1-2週	抵達前 1-2日
結束	離開後 4週	離開後 4週	離開後 7日
副作用 ("★"數目愈多，表示副作用愈明顯)			
失眠	★	★★★★	★
噁心感	★★★★	★★	★
腹瀉	★★	★	★
頭痛	★★	★★	★
頭暈	★	★★	★
視力 模糊	★	★★	★
曬傷	★★★★	★	(尚無 案例)
陰道 感染	★★★★	★	(尚無 案例)