

肝癌治療	第一線	第一線	第一線
學名	Atezolizumab + bevacizumab	Sorafenib	Lenvatinib
商品名	Tecentriq + Avastin 癌自禦 + 癌思停	Nexavar 蕾莎瓦	Lenvima 樂衛瑪
藥物分類	PD-1 免疫檢查點抑制劑+ 單株抗體	標靶藥物	標靶藥物
服用方法	注射針劑，每隔三周打一次	口服，每日早晚1至2顆	口服，每日一次1至3顆
療效與副作用 (依據各藥物的臨床試驗結果，非直接比較)			
平均存活時間	19.2 月	13.4 月	13.6 月
腫瘤消失或縮小比率	35 %	14 %	19 %
常見副作用	皮疹, 肝功能上升, 免疫性肺炎, 疲倦, 血壓升高, 腹瀉, 腹痛, 免疫相關反應	血壓升高，手足反應(手掌、腳底紅腫或起水泡)，噁心, 嘔吐	高血壓, 疲倦, 腹瀉, 食慾降低, 關節痛, 蛋白尿, 甲狀腺功能異常
因副作用而治療中斷比率	15.5 %	10.3 %	9 %
健保條件: 三種一線藥物擇一使用	是	是	是
是否有健保二線藥	無	有	無
繼續申請健保條件	要完全或部分緩解	要無疾病惡化	要無疾病惡化
製表: 蘇培元醫師 2023.08			