

腳本範例_教學影片教案設計

片名：引流管照護須知

場景	拍攝內容	畫面 VIDEO	旁白 AUDIO	備 註
		片名：引流管照護須知		
準備室	用物準備	△用物分別拍攝	準備用物如下： 紗布、Y型紗布或棉墊、無菌棉枝、紙膠、優碘藥水、無菌生理食鹽水、2%克菌寧殺菌水溶液	道具：各項用物
病房	引流管換藥方法	△洗手 △乾洗手	換藥前先洗手，正確洗手方法【內(手心)、外(手背)、夾(指間)、弓(指背)、大(拇指)、立(指尖)、完(結束)】 洗手乳洗手一次至少需要 40-60 秒 乾洗手一次至少需要 20-30 秒	
病房	優碘消毒法	△打開優碘 △打開無菌棉枝 △往下折 △優碘滴在棉枝 △手提引流管 △由內而外消毒 △用生理食鹽水清潔	優碘消毒法 先打開優碘溶液，接著打開無菌棉枝，將開口往下折露出木頭，勿碰觸開口內側，取出棉枝，以倒出溶液方式將優碘滴在棉枝，以一手輕提引流管遠端，將沾優碘的棉枝，由內而外，環形消毒約 4-5 公分寬，勿在同一處來回擦拭，等乾燥或 30 秒後再用生理食鹽水清潔。	
病房	蓋紗布	△打開紗布與覆蓋過程	傷口消毒清潔之後，以無菌方式打開紗布，手指抓住 Y 型紗布兩邊角，一塊開口向上，一塊開口向下蓋住傷口。	
病房	膠帶固定	△取適當膠帶 △貼膠帶 △圖片：四枝、頭部紗繃、網套	再取適當長度的膠帶固定紗布，不可用力拉緊，以免造成皮膚受損。再取一段膠帶將引流管固定於身體上，避免因拉扯而脫出。	
病房	正確洗手	洗手流程	換藥後要洗手，依正確洗手方法洗手。	
	引流管傾倒方法		引流管傾倒方法	

病房	圓盤式引流管傾倒方法		<p>圓盤式引流管傾倒方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.將引流管上段反折。 2.打開蓋子並倒在劃好刻度的塑膠杯量量。 3.壓扁圓盤將蓋子蓋上。 4.打開夾子。 5.記錄引流量。 	
	引流管居家照護注意事項	<p>△字卡配合畫面或照片</p> <p>△壓扁</p> <p>△記錄</p> <p>△勿碰觸量杯</p> <p>△洗手</p> <p>△綁於大腿</p> <p>△平放床上</p> <p>△檢查</p> <p>△護理人員指導</p> <p>△異常圖片</p> <p>△字卡</p>	<p>引流管居家照護注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.引流球要依醫囑指示壓扁以維持負壓引流。 2.每日記錄引流液色、味、量以利門診時醫師拔除引流管參考。 3.排空引流液時，引流袋出口或球口勿碰觸量杯，處理引流液前後要洗手。 4.下床活動時將引流袋、引流球綁於大腿或放口袋，保持低於傷口部位，臥床時則平放於床上。避免引流管壓迫及扭曲。 5.應常檢查引流管接頭是否有鬆脫。 6.出院前由護理人員指導如何檢查引流管內有無阻塞物，由上往下捏扭，以維持引流管之通暢。 7.有下列情況請立即返診： <ol style="list-style-type: none"> (1)引流液顏色有異常改變，例如變混濁或黃、黑、褐等顏色之分泌物。 (2)引流量異常增加或是引流出大量鮮紅色血液。 (3)若引流量突然減少或無引流量，且有紗布滲濕情況，代表著引流管可能有阻塞情形，需回診檢查、治療。 (4)劇烈的疼痛及嘔吐。 (5)引流管滑脫、引流球無法壓扁。 (6)發燒或心跳加快 	<p>配合圖片</p> <p>配合圖片</p>

		△字卡	歡迎諮詢: 若住院期間對於引流管照護仍不了解， 請您在住院期間詢問醫護人員， 出院後有任何問題可立即返院求診 也歡迎您打電話詢問。 諮詢專線: 04-7256652 祝您早日康復!	
--	--	-----	---	--