

3. 注射部位可能有表面不平整現象，觸感異常，或是注入物產生位移的情形。
4. 注射部位的皮膚，可能因皮膚透光度改變而影響膚色。
5. 如有傷口感染或化膿，需接受抗生素治療。
6. 曾有臉部皰疹的患者，扎針處可能有引發皰疹發作的危險性。
7. 極少數患者可能出現過敏性肉芽腫。

自我評量(是非題)

- () 1. 治療後可能會出現紫斑或瘀青現象約2週左右會慢慢消退。
- () 2. 為免玻尿酸被很快分解而失去療效，注射後請避免暴露在過熱過冷或是強熱光源的地方。
- () 3. 注射後當天就可以敷臉。

請寫下您的問題：_____

參考資料：

臺灣皮膚科醫學會「皮膚雷射治療守則」。

制定日期：2021年1月

編碼：800-單張-中文-002-01

題號	1	2	3
解答	O	O	X

玻尿酸注射劑 注意事項



諮詢專線：(04)7238595轉5255 / 5256 / 4183

諮詢專線服務時間：

週一到週五 9:00- 21:00

週六 9:00- 12:00

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：[//www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx](http://www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx)

衛教天地



彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、簡介：

玻尿酸是一種非永久性的皮內或皮下填充劑，目前主要是由細菌發酵，屬於非動物來源的玻尿酸。可以填補臉部一些因為軟組織流失而造成的凹陷以及皺紋，也可以加強臉部的支撐，改善鬆弛，讓臉部線條變得年輕，也可以施打鼻子下巴，讓五官更為立體。

玻尿酸有小分子，中分子，大分子，依每個人的狀況不同，須由醫師評估後選擇適合的劑型施打。

因為注射部位及使用產品不同，個人體質也不相同，因此注射後成效維持期長短也有差異。

二、適應症(僅列常用)：

凹疤、皺紋、臉部輪廓之修飾。

三、注意事項：

1. 如有用阿斯匹靈或其他抗凝血劑，可能會增加注射部位瘀青及流血的風險，請告知你的醫師。
2. 注射後之傷口通常不須要特別照顧，但應避免在注射後當天做臉、敷臉等可能造成局部傷口感染之行為。
3. 於注射後約1~2天應盡量避免大力碰觸或按摩注射區域。此段時間可輕柔地使用水及肥皂清潔，同時輕微的卸妝是可被允許的。

4. 注射部位可能有輕微紅、腫脹、搔癢及注射部位有異常的觸感等，通常會在幾天後消失。如紅腫現象一直持續，則需要回診並進一步處理。

5. 豐唇治療後的腫脹情形會持續較久，可能長達一星期。
6. 為免玻尿酸被很快分解而失去療效，注射後請避免暴露在過熱過冷或是強熱光源的地方(如三溫暖、日光浴室、日光浴或極冷處)。

四、作用及相對不適應症：

1. 孕婦、有感染性病灶之患者，治療前應由醫師評估。
2. 治療後可能會出現紫斑或瘀青現象，約2週左右會慢慢消退。