

四、副作用及相對不適應症

1. 孕婦、光敏感皮膚及感染性傷口，治療前應由醫師評估。
2. 若有皮膚乾癢不適、曬傷、濕疹、毛囊炎，皰疹等的部位，不適做雷射治療。
3. 治療後可能有色素沉澱現象產生，一般6~12個月後會慢慢淡化。
4. 如有傷口感染或化膿，需接受抗生素治療。
5. 有蟹足腫體質者，請於術前告知醫師。

自我評量(是非題)

- () 1. 術後需加強保濕及防曬，並盡量減少戶外休閒活動，避免雷射術後色素沉澱。
- () 2. 若有皮膚乾癢不適、曬傷、濕疹、毛囊炎，皰疹等的部位，可以做雷射治療。
- () 3. 術後清潔及保養需輕柔，可用溫和的洗面乳清洗。需加強保濕。

請寫下您的問題：_____

參考資料：

臺灣皮膚科醫學會「皮膚雷射治療守則」。

制定日期：2021年1月

編碼：800-單張-中文-003-01

題號	1	2	3
解答	O	X	O

飛梭雷射 注意事項



諮詢專線：(04)7238595轉5255 / 5256 / 4183

諮詢專線服務時間：

週一到週五 9:00- 21:00

週六 9:00- 12:00

讚美專線：(04)7238595轉3920

抱怨專線：(04)7238595轉3925

網址：[//www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx](http://www.cch.org.tw/knowledge/knowledge.aspx)

衛教天地



彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、簡介：

屬於分段雷射療法 (Fractional Photothermolysis)，包括兩大類機種：汽化性及非汽化性。

本院是汽化性飛梭雷射 (使用二氧化碳雷射)。

傳統的磨皮雷射，會造成大面積開放性傷口，並且會有大量的組織滲液，使的傷口的照顧相當不容易，往往要幾個月的恢復期。

飛梭雷射利用雷射探頭，產生許多微小雷射光束，在皮膚上產生許多細細小小的傷口，飛梭雷射因為皮膚傷口的很少，使的皮膚發炎紅腫時間，以及傷口的恢復期都大幅的縮短，所以，飛梭雷射後來便取代的磨皮雷射的角色。

利用這些微小的傷口，啟動皮膚的修復能力，並且促進膠原蛋白的再生，使的疤痕可以重新塑形，也可以改善細紋，老化鬆弛。

另外，因為分段治療的關係，飛梭雷射必須要多次的療程，來達到治療效果。而療程的次數，會因為每個人的狀況，而有不同。

二、適應症 (僅列常用)：

各種皮膚疤痕、細紋、老化鬆弛、毛孔粗大、膚色暗沉、回春等。

三、注意事項：

1. 曾有局部麻醉藥劑或外用藥膏過敏的患者，請於術前告知醫師。

2. 治療後請立即冰敷直至熱脹感緩解。治療完返家後，當天可採間歇冰敷的方式，以減少發炎，避免雷射術後色素沉澱。
3. 治療後3~7天內會有微紅及腫脹，並逐漸轉成細微的小痂皮，痂皮約在5天到兩週內自行脫落，痂皮脫落前有輕微搔癢，切記不可搔抓。
4. 術後清潔及保養需輕柔，可用溫和的洗面乳清洗。需加強保濕。
5. 術後需加強保濕及防曬，並盡量減少戶外休閒活動，避免雷射術後色素沉澱。術後宜避免劇烈運動。
6. 術後一周內，避免可能造成感染或刺激皮膚之行為，例如：做臉、敷臉、去角質、塗抹刺激性保養品 (果酸，水楊酸) 或是藥品 (A酸及杜鵑花酸)，泡溫泉，烤箱，蒸氣室等。